



Thuốc Chủng Ngừa Sùi Uốn Ván và Bạch Hầu (Td) Tetanus and Diphtheria (Td) Vaccine

Chủng ngừa đã cứu được nhiều sinh mạng tại Canada trong 50 năm qua hơn bất cứ biện pháp nào khác về sức khỏe.

Thuốc chủng ngừa Td là gì?

Thuốc chủng ngừa Td bảo vệ chống 2 căn bệnh:

- Sùi uốn ván
- Bạch hầu

Thuốc chủng này được Bộ Y Tế Canada phê chuẩn và được cung cấp miễn phí. Hãy gọi cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe để xin hẹn.

Ở tuổi thơ, chủng ngừa sùi uốn ván và bạch hầu thường được kết hợp với các loại thuốc chủng khác như ho gà (ho rít) và sốt tê liệt. Những loại này được chủng theo một loạt nhiều liều. Đa số trẻ được chủng những loại này lúc sơ sinh và trong tuổi chập chững. Các em được chủng một liều tăng cường trước khi học lớp mẫu giáo và chủng một lần nữa khi học lớp 9.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy đọc các HealthLinkBC Files:

- [#15b Thuốc Chủng Ngừa Bạch Hầu, Sùi Uốn Ván, Ho Gà, Sốt Tê Liệt, Trục Khuẩn Gây Viêm Màng Não Loại b \(DTaP-IPV-Hib\)](#)
- [#15d Thuốc Chủng Ngừa Bạch Hầu, Sùi Uốn Ván, Ho Gà, Sốt Tê Liệt \(DTaP-IPV\)](#)
- [#18c Thuốc Chủng Ngừa Sùi Uốn Ván, Bạch Hầu, Ho Gà \(Tdap\)](#)
- [#105 Thuốc Chủng Ngừa Bạch Hầu, Sùi Uốn Ván, Ho Gà, Viêm Gan Loại B, Sốt Tê Liệt, và Trục Khuẩn Gây Viêm Màng Não Loại b \(DTaP-HB-IPV-Hib\)](#).

Ai nên chủng ngừa Td?

Thuốc chủng ngừa này có thể được chủng cho người đủ 7 tuổi.

Người lớn nào đã được chủng ngừa sùi uốn ván và bạch hầu trước đây nên chủng ngừa một liều tăng cường ngừa Td 10 năm một lần. Liều tăng cường này củng cố hoặc tăng cường hệ thống miễn nhiễm để bảo vệ hiệu quả hơn chống lại các bệnh này.

Người lớn nào chưa chủng ngừa hoặc không có hồ sơ chủng ngừa trước đây cũng nên chủng ngừa bệnh này. Cũng nên chủng thuốc này cho những người bị đứt da nặng hoặc bị thương sâu vào da mà lần cuối họ chủng ngừa sùi uốn ván đã cách đây từ 5 năm trở về trước.

Nếu quý vị bị đứt da hoặc bị thương nặng, kể cả các lỗ đâm thủng, vết cắn, phỏng hoặc trầy trụa, quý vị nên gặp chuyên viên chăm sóc sức khỏe ngay để được điều trị. Điều này rất quan trọng nếu vết thương nhiễm bẩn.

Điều quan trọng là lưu hồ sơ tất cả những lần chủng ngừa.

Thuốc Chủng Ngừa Td có các lợi ích gì?

Thuốc chủng ngừa Td là cách tốt nhất để bảo vệ chống sùi uốn ván và bạch hầu, là những căn bệnh nghiêm trọng và đôi khi làm thiệt mạng.

Khi quý vị chủng ngừa là cũng giúp bảo vệ những người khác.

Các phản ứng nào có thể xảy ra sau khi chủng ngừa?

Các loại thuốc chủng rất an toàn. Chủng ngừa an toàn hơn nhiều so với trường hợp bị bệnh sùi uốn ván hoặc bạch hầu.

Các phản ứng thông thường với thuốc chủng có thể gồm đau nhức, tấy đỏ và sưng tại chỗ tiêm chủng.

Có thể cho uống Acetaminophen hoặc Tylenol® nếu bị sốt hoặc đau nhức. **KHÔNG** nên cho bất cứ người nào dưới 20 tuổi uống ASA or Aspirin® vì rủi ro bị Hội Chứng Reye.

Muốn biết thêm chi tiết về Hội Chứng Reye, hãy đọc HealthLinkBC File [#84 Hội Chứng Reye](#).

Điều quan trọng là ở lại phòng chùng ngừa 15 phút sau khi chùng bất cứ loại thuốc gì vì có thể xảy ra phản ứng dị ứng như sốc đe dọa đến mạng sống tuy rất hiếm khi xảy ra. Phản ứng này có thể gồm phát ban, khó thở, hoặc sưng cổ họng, lưỡi hoặc môi. Nếu bị phản ứng này sau khi rời phòng chùng, hãy gọi số 9-1-1 hoặc số khẩn cấp địa phương. Phản ứng này có thể điều trị được, và xảy ra cho dưới 1 người trong mỗi một triệu người chùng ngừa.

Điều quan trọng là luôn luôn trình báo các phản ứng nghiêm trọng hoặc bất ngờ cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Ai không nên chùng ngừa Td?

Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị hoặc con quý vị trước đây đã bị phản ứng đe dọa đến tính mạng khi chùng ngừa sởi uốn ván hoặc bạch hầu, hoặc đối với bất cứ thành phần nào của thuốc chùng.

Những người bị Hội Chứng Guillain-Barré (GBS) trong vòng 8 tuần sau khi chùng ngừa sởi uốn ván, mà không biết là do nguyên nhân nào khác, thì không nên chùng ngừa Td. GBS là một tình trạng có thể làm yếu và tê liệt các bắp thịt trong cơ thể nhưng hiếm khi xảy ra. Hội chứng này thường xảy ra nhất sau khi bị nhiễm trùng, nhưng trong một vài trường hợp hiếm hoi cũng có thể xảy ra sau khi chùng ngừa một số loại thuốc chùng nào đó.

Không cần phải hoãn chùng ngừa vì bị cảm hoặc bị bệnh nhẹ khác. Tuy nhiên, nếu quý vị lo ngại, hãy nói chuyện với chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

Sởi Uốn Ván và Bạch Hầu là gì?

Sởi uốn ván, còn được gọi là khóa hàm, do một loại vi trùng phần lớn có trong đất gây ra. Khi

xâm nhập cơ thể qua một vết đứt da hoặc trầy trụa, vi trùng này tiết ra một độc tố có thể làm co thắt bắp thịt khắp cơ thể thật đau đớn. Bệnh này rất nghiêm trọng nếu các bắp thịt hô hấp bị ảnh hưởng. Có đến 1 trong 5 người bị sởi uốn ván có thể thiệt mạng.

Bạch hầu là một chứng nhiễm trùng mũi và cổ họng nghiêm trọng do vi trùng bạch hầu gây ra. Vi trùng này lan truyền qua không khí khi nháy mũi hoặc ho và khi tiếp xúc da trực tiếp với nhau. Bệnh này có thể đưa đến các vấn đề hô hấp rất nghiêm trọng. Bệnh này cũng có thể làm trụy tim và tê liệt. Khoảng 1 trong 10 người bị bạch hầu có thể thiệt mạng.

Ngày nay hiếm xảy ra các bệnh này tại British Columbia nhờ các chương trình chùng ngừa trẻ thơ thông lệ.

Ứng Thuận của Vị Thành Niên Chính Chấn

Cha mẹ hoặc người giám hộ và các con nên nói chuyện về việc ứng thuận chùng ngừa. Sẽ có nỗ lực xin phép cha mẹ/người giám hộ hoặc người đại diện ứng thuận trước khi chùng ngừa. Tuy nhiên, luật pháp cho phép trẻ em dưới 19 tuổi mà hiểu được các lợi ích và phản ứng có thể xảy ra của mỗi loại thuốc chùng và rủi ro của việc không chùng ngừa thì có thể ứng thuận hoặc từ chối chùng ngừa.

Muốn biết thêm các đề tài của HealthLinkBC vào www.HealthLinkBC.ca/healthfiles hoặc đến phòng y tế công cộng tại địa phương quý vị.

Bấm vào www.HealthLinkBC.ca hoặc gọi số **8-1-1** để biết chi tiết và các dịch vụ sức khỏe không cấp thiết tại B.C.

Muốn tìm trợ giúp cho người điếc và khiếm thính, gọi số 7-1-1 tại B.C.

Có dịch vụ dịch thuật với hơn 130 ngôn ngữ khi có yêu cầu của quý vị.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority